Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHLEBOLOGIE

Quels choix thérapeutiques pour traiter les veines tributaires variqueuses des troncs saphéniens ?

Josnin M., Neaume N.

« L'ablation endoveineuse des troncs saphènes est devenue le gold standard du traitement des varices. Elle fait l'objet de recommandations de haut grade par l'ensemble des société savantes internationales. Le traitement chirurgical des varices fait partie des 55 actes devant être réalisés en chirurgie ambulatoire en France.

Le traitement de ces troncs peut être également accompagné par celui de leurs tributaires variqueuses selon principalement deux modalités : la sclérothérapie et/ou la phlébectomie. Ces traitements complémentaires pourront se faire de manière concomitante ou différée. Les options thérapeutiques s'offrant au praticien sont donc très variées.

Il apparaît donc nécessaire d'en maîtriser les aspects sécuritaires d'efficacité et économiques, pour optimiser le choix thérapeutique.

Les deux articles suivants tenteront de répondre à ces problématiques ».

What are the therapeutic choices for treating varicose tributary veins of saphenous trunks?

Josnin M., Neaume N.

Endovenous ablation of saphenous trunks has become the gold standard in the treatment of varicose veins. It is the subject of high-grade recommendations by all international learned societies. The surgical treatment of varicose veins is one of the 55 procedures to be performed in outpatient surgery in France.

The treatment of these trunks can also be accompanied by that of their varicose tributaries according to mainly two modalities: sclerotherapy and/or phlebectomy. These complementary treatments may be carried out concomitantly or deferred. The therapeutic options available to the practitioner are therefore very varied.

It is therefore necessary to control the safety, efficacy and economic aspects of these options in order to optimize the therapeutic choice.

The following two articles will attempt to address these issues".