

Session-débat inaugurale avec la V-Win Foundation *Inaugural panel session with the V-Win Foundation*

Voir le replay : <https://app.swapcard.com/event/8oes-journees-de-la-sfp-2022-or-paris/plannings/RXZlbnRWaWV3XzQyMDMzMw==>



80es Journées de la SFP Paris, Ter, 2 & 3 décembre 2022 | CENTRE DES CONGRÈS DE LA CITÉ DES SCIENCES & DE L'INDUSTRIE

REPLAY - SESSION V-WIN FOUNDATION

vendredi 2 décembre 2022 08:30 à 10:15 - 1 h 45 min (Europe/Paris)

Amphithéâtre Gaston BERGER

V WIN FOUNDATION

Plein écran

Informations

Modérateurs : P. RAYMOND-MARTIMBEAU, S. GIANESINI, M. JOSNIN, & N. NÉAUME

-

Opening, par les modérateurs

Sclerotherapy along the decades. Jean-Luc GILLET

World Around. Maurizio PAGANO, Ravul JINDAL, Thomas JAMMES, Wassila TAHA.

[Voir plus](#)



Official program



Participants enregistrés



Anne-Laure Lenoir
CCA
CHU de Lille

00



Cédric FORMET
Médecin Libéral
ganges

00



CHRISTINE LEHMANN
Médecin Libéral
CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE

00

[Tout voir \(3\)](#)

Les Présidents Matthieu Josnin et Sergio Giancesini

The chairmen



80th French Society of Phlebology annual meeting v-WIN session

Sergio Giancesini



80es Journées de la SFP Paris. 1er, 2 & 3 décembre 2022 | CENTRE DES CONGRÈS DE LA CITÉ DES SCIENCES & DE L'INDUSTRIE



LES THÉMATIQUES ET LES ORATEURS

THEMES AND SPEAKERS

Vendredi 2 dec.

SESSION V-WIN FOUNDATION

Modérateurs : P. RAYMOND-MARTIMBEAU, S. GIANESINI, M. JOSNIN, & N. NÉAUME

REPLAY - SESSION V-WIN FOUNDATION

vendredi 2 décembre 2022 08:30 à 10:15 · 1 h 45 min (Europe/Paris)

Amphithéâtre Gaston BERGER

V WIN FOUNDATION

Informations

Modérateurs : P. RAYMOND-MARTIMBEAU, S. GIANESINI, M. JOSNIN, & N. NÉAUME

- **Opening.** par les modérateurs

Sclerotherapy along the decades. Jean-Luc GILLET

World Around. Maurizio PAGANO, Ravul JINDAL, Thomas JAMMES, Wassila TAHA.

Superficial endovenous treatments today. Makoto MO

Top Expert World Around. Massimo DANESE, Nicolas NÉAUME, Lorena GRILLO, Rodrigo RIAL

Needs for a better phlebology future. Stanley ROCKSON

Top Expert World Around. Deena AL QEDRAH, Christopher PITTMAN, Paolo VALLE, Matthieu JOSNIN

Best near East North Africa evidence - based comment. Zaza LAZARASHVILI, A. FAKHRY

Open Discussion.

Honorary Final Remarks. Joseph CAPRINI, Matthieu JOSNIN, Nicolas NÉAUME, Oscar BOTTINI, Willy CHI

[Voir moins](#)

Participants enregistrés

AL	Anne-Laure Lenoir CCA CHU de Lille	0/0
CF	Cédric FORMET Médecin Libéral ganges	0/0
CL	CHRISTINE LEHMANN Médecin Libéral CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE	0/0

[Tout voir \(9\)](#)

La V-Win Foundation

The V-Win Foundation



WHO WE ARE

The vWIN has been created by an idea of
Sergio Giancesini, Oscar Bottini and Yung-Wei Chi,
three vein specialists working in three different universities
of three different continents,
with the idea of gathering the medical and public world
together for health and science promotion.

A scientific committee is created
by world renowned physicians and scientists.

Sergio Giancesini



President
University of Ferrara, ITALY

Oscar Bottini



Honorary president
Universidad de Buenos Aires,
ARGENTINA

Yung-Wei CHI



Scientific director
University of California Davis, USA

WHAT WE DO

📄 DOWNLOAD the 2019-2021 vWIN major activities

📄 2021 v-WIN annual report

SCIENTIFIC RESEARCH & MEDICAL EDUCATION



The foundation is focused on evidence-based research in venous and lymphatic disease and related specialties. International scientific meetings are organized every year.

[More](#)

HUMANITARIAN PROJECTS



The foundation members have been involved with humanitarian projects in Central America, now paving the way toward new projects in Central America and Asia.

[More](#)

SOCIAL & SPORT EVENTS



The foundation has created an International public health awareness project, developed during open sport and social events, under the auspices of the Italian Olympics Committee and of the Italian Golf Federation.

[More](#)



START vWIN Pelvic Venous Awareness Questionnaire
ENG SPA ITA version



START vWIN Pelvic Venous Awareness Questionnaire
RUS GEO CHI version

CVD global practice survey



START Putra University / v-WIN survey on CVD global practice

CVD global practice survey



10 Golden Rules in Venous-Lymphatic management

WIN AN EDUCATIONAL TRIP
Rules and Regulations

SMACVE bulletin

PHLEB-ortho survey



SURVEY about orthopaedics graduated compression use


START SURVEY




SURVEY about orthopaedics graduated compression use CHINESE & RUSSIAN version

START SURVEY CHINESE & RUSSIAN VERSION

vWIN Phlebo-Lymphology Training Survey



START vWIN Phlebo-Lymphology Training Survey
ITA SPA ENG version



START vWIN Phlebo-Lymphology Training Survey
CHINESE & RUSSIAN VERSION

La sclérothérapie au travers des âges



Sclerotherapy over the ages

Gillet J.-L.

<https://app.swapcard.com/event/8oes-journees-de-la-sfp-2022-or-paris/planning/UGxhbm5pbmdfMTA5MTAoNQ==>

Two crucial developments in the 90s

1. Ultrasound guidance: Knight R. M. & Vin F. (1988)
→ prevent intra-arterial injection

SS Artery

REPLAY - SESSION V-WIN FOUNDATION

🕒 vendredi 2 décembre 2022 08:30 à 10:15 · 1 h 45 min (Europe/Paris)

📍 Amphithéâtre Gaston BERGER

🏢 V WIN FOUNDATION

🖥️ Plein écran

Informations

Modérateurs : P. RAYMOND-MARTIMBEAU, S. GIANESINI, M. JOSNIN, & N. NÉAUME

-

Opening, par les modérateurs

Sclerotherapy along the decades. Jean-Luc GILLET

World Around. Maurizio PAGANO, Ravul JINDAL, Thomas JAMMES, Wassila TAHA.

[Voir plus](#)

📅 Official program >

Participants enregistrés

AL

Anne-Laure Lenoir

CCA
CHU de Lille

👤

CF

Cédric FORMET

Médecin Libéral
ganges

👤

CL

CHRISTINE LEHMANN

Médecin Libéral
CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE

👤

Tout voir (0)



Historical background

Venous disease was identified in ancient times
Egypt — Ancient Rome — Greece

Athens
Archaeological museum

First injections of sclerosing solutions in the mid-19th century
Pravaz (1840) - Cassaigione (1853)

Development of sclerotherapy over the 20th century
Various sclerosing solutions classified in three categories

Techniques of sclerotherapy



Different strategies

Sigg K. (Switzerland): from bottom to top

Fegan W.G. (Ireland) : perforating veins

France: R. Tournay and P. Wallois

- Reflux at the SFJ / SPJ
- Saphenous veins

R. Tournay. Les varices, pratique des injections sclérosantes, Ed. Maloine, 1929

Injection

Open needle (French technique)

Open/short catheter (L. Grondin, 1992)

Long catheter (Robert C. 1995)

Three categories of sclerosing solutions



1- Detergent solutions

Sodium morrhuate - *Rogers and Winchester (1930)*

Ethanolamine oleate (**Ethamolin®**)

Sodium tetradecyl sulfate - *Reiner (1946)*

Polidocanol (1966) - initially local anesthetic

2- Osmotic solutions

Hypertonic saline (sodium chloride 23%) - *Linser (1924)*

Dextrose 25%

Alcool → venous malformations

3- Chemical solutions

Variglobin® (Polyiodinated iodine) – K. Sigg (Switzerland)

Scleremo® (glycerol) → spider veins

Two crucial developments in the 90s



1. Ultrasound guidance: Knight R. M. & Vin F. (1988)


→ prevent intra-arterial injection



Two crucial developments in the 90s



1. Ultrasound-guided sclerotherapy



Two crucial developments in the 90s



2. Foam sclerotherapy:

Advantage: foam doesn't mix much with blood
mechanisms of dilution do not happen

- * MC Ausland (1939): injection of « foam » produced by shaking a bottle of morrhuate
- * M Grigg: « Irvine technique »: two syringes connected by a tubing
- J Cabrera (Spain – 1995)
- A Monfreux (France – 1997)
- L Tessari : three-way tap (2001)
Double Syringe System : Tessari-DSS method
DSS : female-female Luer lock connector

It is worth noting that only detergent solutions can foam.



Tessari-DSS



Sterivein®



Automated device: Turbofoam®



Homogeneous foam



Debates



1. Gas : Air vs other gas (O₂ – CO₂ – CO₂O₂)

Role of Gas
(Mitschke, G. et al. Eur J Vasc Med Biol 2010)

Condition	Gas			p (Air / CO ₂ -O ₂)
	Air	CO ₂	CO ₂ -O ₂	
Chest tightness	9 (18%)	4 (3.1%)	0 (0%)	p< 0.05
Dry cough	8 (16%)	2 (1.6%)	0 (0%)	p< 0.05
Dizziness	6 (12%)	4 (3.1%)	1 (1%)	p=0.002
Visual Disturbance	4 (8.2%)	4 (3.1%)	2 (2%)	p: NS (P= 06)
Metallic/med taste	0 (0%)	2 (1.6%)	1 (1%)	p: NS
Nausea	2 (4%)	3 (2%)	0 (0%)	p: NS
Circumoral paraest	0 (0%)	1 (0.8%)	0 (0%)	p: NS

Not a randomised study – Comparison with historical data (J Vasc Surg 2008)
Large injected volumes: average volumes: 27 ml, 25 and 22 mL

Less stable foam

Studies in everyday practice: no difference

Recommendation: Air (Grade 1A) or CO₂O₂ (Grade 2B)

European guidelines for sclerotherapy Rabe E et al. Phlebology 2013

Debates



2. Volume : different practices in Europe and in Anglo-Saxon countries

Maximum of 10 mL of foam per session in routine cases

*European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders
: Rabe E et al. Phlebology 2013*

3. Room air vs sterile gas

No infection / septicemia due to injection of air has been reported

Filter is recommended

4. Home made foam vs manufactured / standardized foam

- Tessari-DSS technique

- Provensis-BTG technique (Varisole – Varithena[®])

Debates



5. Complications

* *Thromboembolic events*

No significant difference with the other methods

* *Neurological complications*

- Stroke: exceptional

- Visual disturbances: correspond to Migraine with Aura and are not TIA.


Gillet JL et al, Phlebology 2010

Efficacy

Rasmussen L, Journal of Vascular Surgery 2013 - Inter Angiol 2017




More recanalizations with foam



Legs without GSV failure

Clinical assessment



Legs without recurrent varicose veins

What is the place of sclerotherapy today ?



1. Treatment of GSV / SSV

French guidelines

Trunk Diameter	Technique
> 8 mm	T. Ablation
4 – 8 mm	USG Foam Sclero or T A
< 4 mm	USG Foam Sclero 1st line

Glue ?

2. Sclerotherapy is the only technique that can deal with **all types of veins**, from saphenous veins to spider veins, including recurrent varicose veins and perforating veins.

Conclusion



- Sclerotherapy: long history since the mid-19th century
- The 90s: - Ultrasound guidance
 - Foam → Ultrasound Guided Foam SclerotherapyTwo essential steps.
- Eclectic technique, which addresses all types of veins, except for very large saphenous veins (→ *thermal ablation*) or veins very close to the skin (risk of pigmentation → *phlebectomy*)
- Basic technique in Phlebology ++
Good (and long) training is necessary to obtain good results and to avoid side effects.
- As always in medicine, complications can occur.
→ Respect of guidelines and contraindications.

80th CONGRESS OF SFP | DEC. 1st, 2nd, 3rd, 2022 | PARIS

Revoir le débat sur la sclérothérapie

Revisit the debate on sclerotherapy

Voir le replay : <https://app.swapcard.com/event/8oes-journees-de-la-sfp-2022-or-paris/planning/UGxhbm5pbmdfMTA5MTAoNQ==>

Le panel



Maurizio Pagano



Voir le replay du Symposium KREUSSLER : Sclérothérapie, le bon protocole pour un traitement standardisé

*Watch the replay of the KREUSSLER Symposium:
Sclerotherapy, the right protocol for a standardised
treatment*

Voir le replay : <https://app.swapcard.com/event/8oes-journees-de-la-sfp-2022-or-paris/planning/UGxhbm5pbmdfMTA5MTA2Mg==>



The screenshot shows a video player interface. On the left, there is a poster for the '80^{es} Journées de la SFP Paris' held from December 1st to 3rd, 2022, at the Centre des Congrès de la Cité des Sciences & de l'Industrie. The poster features a red circular graphic with white lines. On the right, a white box contains the text: 'REPLAY SYMPOSIUM KREUSSLER', 'jeudi 1 décembre 2022 12:15 à 13:15 · 1 h (Europe/Paris)', and a 'Plein écran' (Full screen) button.

Informations

SYMPOSIUM KREUSSLER : SCLEROTHERAPIE, LE BON PROTOCOLE POUR UN TRAITEMENT STANDARDISÉ

Intervenants : Matthieu JOSNIN & Nicolas NÉAUME

Jeudi 1^{er} déc.

SYMPOSIUM KREUSSLER SCLEROTHERAPIE, LE BON PROTOCOLE POUR UN TRAITEMENT STANDARDISÉ

Intervenants : Matthieu JOSNIN & Nicolas NÉAUME

Sclérothérapie à la mousse

Actualités réglementaires

KP - 01/12/2022

Du côté laboratoire - Actions futures

1. Développer un dispositif spécifique à la sclérothérapie
2. Mettre à jour les RCP en collaboration avec l'ANSM

Introduction / Contexte

- Fin 2021, notification d'un cas d'arrêt cardio-respiratoire quelques minutes après une séance de sclérothérapie à la mousse
- Initiation par l'ANSM de plusieurs actions
- But de l'ANSM:
 - comprendre les pratiques cliniques / les difficultés
 - accompagner les praticiens - en collaboration avec les laboratoires concernés - à travers des actions de minimisation des risques et l'amélioration du Bon Usage

Du côté laboratoire - Actions réalisées

- Modification des RCP (Fev. 2022) à la demande de l'ANSM
 - Réduction du volume max. injecté par séance
 - de 16 ml à 10 ml de mousse
- Rencontre ANSM / Laboratoire (Sept. 2022)
 - Rappel de l'obligation d'information de l'ANSM sur les mésusages +++
 - Etude et proposition de dispositif le mieux adapté pour produire une mousse standardisée de bonne qualité
- Contribution à un projet ANSM de fiche de recueil PV
- Mise à jour du Guide Prescripteur (avec ANSM)

Actions de l'ANSM

- Janvier 2022
 - point d'information à destination des praticiens
 - rappel des conduites à tenir afin de réduire les risques CV
- Mars 2022
 - audition de représentants du CNPMV, de la SFP, de France Asso Santé
 - Publication du compte rendu (mai/juin 2022)
- Autres
 - Consultation des états membres (UE)
 - Rencontre avec laboratoire

Le dispositif à développer



Réunion du 3 mars 2022 - Compte Rendu

- Présentation par les experts
 - de la maladie veineuse
 - des référentiels
 - des pratiques cliniques
- Discussions sur les effets indésirables graves
- Discussions sur les pratiques hors-AMM
 - ⇒ dilution hors AMM (concentrations élevées) (référentiel « Concentration de sclérosants en fonction des diamètres veineux »)
 - ⇒ administration sous forme de mousse des spécialités de faibles concentrations non autorisées (sans AMM)

Le dispositif à développer



Guide Prescripteur

Version 1
2013 / 2014

Mise à jour

Version 2
Octobre 2022

GUIDE PRESCRIPTEUR

ATROSCIERA 1 N 021 mg/75 mL
solution injectable

ATROSCIERA THROMBO 1 N 100 mg/27 mL
solution injectable (100 mg en ampoule)

ATROSCIERA THROMBO 1 N 300 mg/27 mL
solution injectable (100 mg en ampoule)

Guide de bonnes pratiques de la sclérothérapie à la mousse

De haute qualité, les interventions réalisées par les médecins phlébologues (PHLEBOLOGES) pour obtenir une mesure de qualité satisfaisante afin de réduire les risques emboliques, thrombotiques et infectieux ont été regroupées dans un schéma thérapeutique à la mousse.

Cette pratique thérapeutique est réservée aux patients souffrant d'une insuffisance veineuse chronique et d'insuffisance de la veine saphène, et plus particulièrement aux patients souffrant d'occlusion chimique et/ou thermique de l'artère à l'occlusion à l'échelle d'artérielle, d'artérielle et/ou d'artérielle.

Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

The larger the diameter, the lower the occlusion rate

Keywords: M. Serrhini, J. C. Lohr, E. Vellodi, E. Giamberini, M. P. Della M., D. L. Serrhini, J. Abbiati, R. Serrhini. Endovenous thermal ablation versus ultrasound-guided foam sclerotherapy for the treatment of great saphenous vein. J Vasc Med Biol. 2018;30(1):1-6.

Guide Prescripteur / Contenu

Partie 1
Qualification des médecins vasculaires et nécessité de formation spécifique

Partie 2
Informations de sécurité sur la mousse

Partie 3
Recommandations sur les modalités d'administration de la mousse

Partie 4
Modalités de préparation de la mousse

4 parties

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Choosing wisely N°4

Except in special cases and contraindications, the foam form of a sclerosing agent should be used rather than the liquid form for the sclerotherapy treatment of a saphenous vein insufficiency or its recurrence.

In case of contraindication to foam, thermal ablation is recommended if feasible

Recommendation 29: We recommend foam sclerotherapy over liquid sclerotherapy for the treatment of saphenous veins (GRADE 1A), venous malformations (GRADE 2B) and recurrent varices after previous treatment, accessory saphenous varices, non-saphenous varices and incompetent perforating veins (GRADE 1C).

Phlébologie

European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Phlebology

European guidelines for sclerotherapy in chronic venous disorders

E. Rabe¹, FX Bres², A. Cavazzi³, P. Coleridge Smith⁴, A. Frullini⁵, JL Gilbert⁶, JJ Gürex⁷, C. Hansel-Desnos⁸, P. Kern⁹, B. Partsch¹⁰, AA Ramelet¹¹, L. Tesari¹² and F. Pannier¹³, for the Guideline Group

Phlébologie, 2018, 71, 4, 4-9-10

Pertinence des soins
"Choosing wisely"

Pertinence des soins pour les saphènes et récidives. Traitements d'occlusion chimique ou thermique dans l'insuffisance des veines saphènes et des récidives.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Reco. 28: Nous recommandons

- la sclérothérapie liquide comme méthode de choix pour l'ablation des télangiectasies et des varices réticulaires (C1) (Grade 1A)
- la sclérothérapie à la mousse des varices C1 comme méthode alternative (Grade 2B)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Choosing wisely N°3

If saphenous vein treatment is considered, for a diameter greater than 8 mm*, thermal ablation must be proposed as a first-line treatment if achievable; ultrasound-guided foam sclerotherapy remains a possible option depending on the context, but with a lower definitive occlusion rate

**measurement of internal diameter taken (patient standing) in a transverse ultrasound cross-section at mid-thigh for the great saphenous vein and at mid-calf for the small saphenous vein, excluding ectasia*

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Reco. 29: Nous recommandons la sclérothérapie à la mousse plus que la sclérothérapie liquide pour le traitement

- des veines saphènes (Grade 1A)
- des malformations veineuses (Grade 2B)
- et des récidives variqueuses après un traitement antérieur, des varices saphènes accessoires, des varices non saphéniennes et des veines perforantes incontinentes (Grade 1C)

Tableau 4. Suggestions de concentrations de POL et de TDSS dans la sclérothérapie à la mousse ^{1, 7, 10, 11, 14, 16-22, 24-26, 30-32, 35, 47, 51, 52, 120, 130}

Indications	Concentration % de POL, Polidocanol		Concentration % de TDSS, tétradécyl sulfate sodium	
	Grade 1B	Grade 2C	Grade 1B	Grade 2C
Télangiectasies	Jusqu'à 0,5	Grade 1B	Jusqu'à 0,25	Grade 2C
Varices réticulaires	Jusqu'à 0,5	Grade 2C	Jusqu'à 0,5	Grade 2C
Varices tributaires	Jusqu'à 1	Grade 1B	Jusqu'à 1	Grade 1C
Veines saphènes	<4 mm	Jusqu'à 2	Grade 1B	Grade 1C
	> 4 mm et < 8 mm	entre 1-3	Grade 1A	entre 1-3
	>8 mm	3	Grade 1A	3
Perforantes incontinentes	entre 1-3	Grade 2B	entre 1-3	Grade 2B
Varices récidivantes	entre 1-3	Grade 2B	entre 1-3	Grade 2B
Malformation veineuse	entre 1-3	Grade 2B	entre 1-3	Grade 2B

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Reco. 19: Pour la sclérothérapie échoguidée, nous recommandons ce qui suit (Grade 1C pour l'ensemble de la procédure) :

Procédure entièrement faite sous échographie en 4 étapes

1. Vérification US de la veine cible et de la zone de ponction
2. Ponction
3. Injection après courte aspiration de sang
4. Contrôle post-injection

(ANAES 2004; Phlébologie 2003; JMV 2006; Traité de Médecine Vasculaire 2011...)

- le segment de veine à injecter et les artères de voisinage sont identifiés par écho-Doppler avant la ponction;
- Pour le traitement par ponction directe des incontinences saphènes de la jonction et du tronc, il est recommandé qu'au moins une ponction veineuse soit effectuée dans la **région proximale** de la cuisse (GVS et SAA) ou dans la région du mollet (PVS);
- dans tous les autres cas, la veine doit être ponctionnée à l'endroit le plus sûr et le plus facilement accessible;
- la veine est localisée par imagerie US dans le sens longitudinal et/ou transversal;
- la veine est ponctionnée sous contrôle échographique et la pointe de l'aiguille est placée au centre de la lumière veineuse;
- le reflux sanguin veineux dans l'aiguille ou le cathéter est vérifié et quelques gouttes de produit sclérosant ou quelques bulles sont poussées dans la veine et vérifiées sur l'écran de l'ED avant l'injection;
- l'injection est réalisée sous contrôle échographique;
- les sclérosants mousse (POL et STS) sont plus adaptés à la sclérothérapie échoguidée que la forme liquide puisque les bulles sont un excellent produit de contraste, offrant une visibilité de l'agent sclérosant;
- lors du contrôle post-injection par ultrasons, la répartition du sclérosant et la réaction de la veine, y compris le **spasme veineux**, sont vérifiés.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Phlébologie 2016, 72, 4, p. 2-3

Accord d'experts

TABLEAU DES CONCENTRATIONS SUGGÉRÉES, EN FONCTION DU DIAMÈTRE DU SEGMENT VARIQUEUX CIBLÉ, POUR LE POLIDOCANOL ET LE TÉTRADÉCYL SULFATE DE SODIUM UTILISÉS SOUS FORME DE MOUSSE EN SCLÉROTHÉRAPIE POUR LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION DES VARICES.

Diamètre veineux (mm)*	Polidocanol % **	Tétradécyl Sulfate de Sodium % **
≤ 2	0,12 à 0,25	0,1
[2-3]	0,25	0,2
[3-4]	0,5	0,5
[4-6]	1	1
[6-8]	2	1 à 3
8 et plus	3	3

* Mesure du diamètre interne du segment varicose ciblée, prise lors de l'examen par ultrasons (échographie Doppler B, coupe transversale).
** Concentrations du produit sclérosant pour être sous mousse avec et (Polidocanol + sulfate de tétradécyl) ou avec et sans (Polidocanol) (100 mg/ml et 100 mg/ml).

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Reco. 3: Effets indésirables (L vs M)

RABE E et al. Phlebology 2014 (+ GUEX JJ. Dermatol. Surg 2010)

Type d'effets indésirables	Liquide	Mousse
choc anaphylactique	* cas isolés	* cas isolés
infection bactérienne sévère	* cas isolés	* cas isolés
AVC et AIT	* cas isolés	* cas isolés
TVE distale (principalement musculaire)	** rare	*** peu fréquent
TVE proximale	* très rare	* très rare
embolie pulmonaire	* cas isolés	* cas isolés
lésion neurologique motrice	** cas isolés	** cas isolés
incontinence urinaire	* très rare	*** peu fréquent
maux de tête et migraines	* très rare	*** peu fréquent
lésion neurologique sensorielle	? non rapporté	** rare
hypertension artérielle	* très rare	* très rare
toxicité hépatique	* très rare	* très rare
TSV	impédicé	impédicé
réaction cutanée (allergie locale)	* très rare	* très rare
Marting	**** commun	**** commun
hyperpigmentation post-injection	**** commun	**** commun
embolie de la peau (phlébite)	** rare	* très rare
infection cutanée (médicaments)	* très rare	* très rare

GRADE 1B

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Reco. 19: Pour la sclérothérapie échoguidée, nous recommandons ce qui suit (Grade 1C pour l'ensemble de la procédure) :

- le segment de veine à injecter et les artères de voisinage sont identifiés par écho-Doppler avant la ponction;
- Pour le traitement par ponction directe des incontinences saphènes de la jonction et du tronc, il est recommandé qu'au moins une ponction veineuse soit effectuée dans la **région proximale** de la cuisse (GVS et SAA) ou dans la région du mollet (PVS);
- dans tous les autres cas, la veine doit être ponctionnée à l'endroit le plus sûr et le plus facilement accessible;
- la veine est localisée par imagerie US dans le sens longitudinal et/ou transversal;
- la veine est ponctionnée sous contrôle échographique et la pointe de l'aiguille est placée au centre de la lumière veineuse;
- le reflux sanguin veineux dans l'aiguille ou le cathéter est vérifié et quelques gouttes de produit sclérosant ou quelques bulles sont poussées dans la veine et vérifiées sur l'écran de l'ED avant l'injection;
- l'injection est réalisée sous contrôle échographique;
- les sclérosants mousse (POL et STS) sont plus adaptés à la sclérothérapie échoguidée que la forme liquide puisque les bulles sont un excellent produit de contraste, offrant une visibilité de l'agent sclérosant;
- lors du contrôle post-injection par ultrasons, la répartition du sclérosant et la réaction de la veine, y compris le **spasme veineux**, sont vérifiés.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Reco. 20: Nous recommandons l'utilisation d'un robinet à trois voies (méthode Tessari) ou d'un connecteur à deux voies (protocole Tessari-DSS) pour la production de mousse sclérosante dans toutes les indications (**Grade 1A**)

Reco. 21: Nous recommandons l'air comme gaz pour la production de la mousse sclérosante quelles que soient les indications (**Grade 1A**) ou un mélange de dioxyde de carbone et d'oxygène (**Grade 2B**).

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

VOLUMES : dépendent de la qualité du remplissage et du spasme

Pour une veine saphène, vous commencez par injecter 1 seringue de 2,5ml de mousse; vous jugerez ensuite, selon le remplissage de la veine et le spasme veineux, si une autre injection doit suivre

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Reco. 22: Nous recommandons un mélange liquide sclérosant/gaz pour la production d'une mousse sclérosante de 1+4 (1 volume liquide + 4 volumes air) à 1+5 (**Grade 1A**). Pour le traitement des varices (CEAP C2), nous recommandons une mousse homogène visqueuse, à fines bulles (**Grade 1C**).

Reco. 23: Nous recommandons que le temps entre la production de mousse et l'injection soit le plus court possible (**Grade 1C**).

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
Phlébologie


Accord AMM
(autorisation de mise sur le marché)

- Pour l'**Aetoxisclérol®** : 1 % kit
: 2 et 3%
- Pour le **Fibrovein®** : 1 et 3%

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
Phlébologie

Reco européenne versus ANSM

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
Phlébologie

Conditions 


- **Pour le Praticien** : Formation spécifique pour la préparation et l'administration de la mousse
- **Pour le Fabricant** :
 - ① éditer un guide de bonne pratique sur l'utilisation de la mousse (conforme au RCP, résumé des caractéristiques du produit)
 - ② mise en place d'une étude observationnelle (avec fiches de recueil EI, surtout TVP et troubles neuro.)

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
Phlébologie

Volumes

RECOMMANDATIONS EUROPEENNES		ANSM (AMM/RCP)	
VOLUME MAXIMUM TOTAL AUTORISÉ PAR SÉANCE			
POLIDOCANOL		POLIDOCANOL	
Liquide	Mousse	Liquide	Mousse
2mg/kg/jour	10 mL (grade 2B)	4 mL (soit 2 ampoules de 2 mL)	AMM pour Aetoxisclérol 1% kit , (Total recommandé 2 à 8 mL) ; Maximum 16 vs 10 mL
TETRADECYLSULFATE de SODIUM		TETRADECYLSULFATE de SODIUM	
Liquide	Mousse	Liquide	Mousse
4 mL pour le 3% 10mL pour le 1%	10 mL (grade 2B)	10 mL (soit 5 ampoules de 2mL)	AMM pour Fibrovein 1 et 3% (Total recommandé 2 à 8 mL) ; Maximum 16 vs 10 mL

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
Phlébologie

La mousse en pratique 

- Aetoxisclérol® 1% kit, 2 et 3% et Fibrovein® 1 et 3%
- Mélange 1+ 4 (1 vol. sclérosant + 4 vol. d'air)
- Air stérilisé ou filtré (filtre 0.2 µ)
- Méthode Tessari (robinet 3 voies) ou équivalent (connecteur 2 voies)+ 2 seringues, ou dispositifs dédiés
- Diamètre aiguilles: au moins 25 G
- Sécuriser l'injection par contrôle échographique
- Mousse injectée en moins de 60 secondes après la fin de sa préparation
- Volume max. total de mousse injectée par séance: **10 mL**

Que retenir

Servez-vous sur notre stand !

- Guide Prescripteur disponible
- Actions futures
 - Développer un dispositif spécifique pour produire une mousse standardisée
- Obligation du laboratoire
 - D'informer l'ANSM de tout usage non conforme aux RCP (dilution / utilisation sous forme de mousse des dosages faibles) ⚠

Voir le replay de la session franco-polonaise

*See the replay of the Franco-Polish session –
The MOCA technique (Non-Thermal, non Tumescient)*

<https://app.swapcard.com/event/8oes-journees-de-la-sfp-2022-or-paris/planning/UGxhbm5pbmdfMTA5MTA2Mg==>



Ablation pharmacomecanique ClariVein (MOCA)

Michael Tal /Elias
Debut 2010 USA Canada Europe
Fin 2013 12000 intervention
2015 60000 interventions

Reduction des limites d'efficacite de l'ablation thermique et de la Sclerotherapie en conjugant leurs avantages. On introduit dans la lumiere un fils rotatif qui en tournant a 3500 tours par minutes lese l'intima et creer un spasme de la vein pendant que le sclerosant sous forme de liquide est infuse par un orifice situe a l'extremite du fils





AUCUN ARTICLE
 Par auteurs
 Par mots-clés
 Par titres
 Par numéros
 RECOMMANDATIONQ AUX AUTEURS
 - français
 - anglais



RECHERCHE AVANCÉE

Auteur : _____ Mots-clés : _____

Titre et résumé : _____ Année de publication : _____

[Lancer la recherche](#)

PAV N°3-SEPTEMBRE

Phlébologie

ANNALES VASCULAIRES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

80^{es} / 1er, 2 & 3 Journées de la SFP Paris

NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

Nous espérons faire croître ensemble cette belle discipline médicale qu'est la Phlébologie !
Matthieu JOSNIN, Président de la SFP

Phlébologie | SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie | Septembre 2022 | Phlébologie 2022, 77 années, n° 3

La FLIP-PAV N°3, n'est accessible qu'aux abonnés

FLIP PAV | Ces livres dédiés aux membres de la SFP | Voir l'article en s'abonnant ici

statistiques de la page (passés heures UTC+1)
 1 janv. 2022 - 31 déc. 2022

4815387	1265	405317
Pages vues	Pages en erreur	Nombre de sessions

S'abonner

Je m'abonne à la Revue de la SFP "Phlébologie Annales vasculaires" (PAV)
 4 numéros par an + accès en ligne à tous les articles

Je choisis mon type d'abonnement pour une année :

Professionnel En UE	Étudiant En UE	Professionnel Hors UE	Étudiant Hors UE
120€ /an	55€ /an	140€ / an	75€ / an
Abonnement annuel à la revue Phlébologie Annales Vasculaires	Abonnement Etudiant annuel à la revue Phlébologie Annales Vasculaires	Abonnement annuel à la revue Phlébologie Annales Vasculaires	Abonnement Etudiant annuel à la revue Phlébologie Annales Vasculaires
S'inscrire	S'inscrire	S'inscrire	S'inscrire



RECHERCHE D'ARTICLES
 DANS LE CATALOGUE

Par auteurs
 Par mots-clés
 Par titre
 Par numéros

RECOMMANDATIONQ AUX AUTEURS
 - français
 - anglais



FLIP PAV N°1 Janvier 2022 en open access



FLIP-PAV n°3 -2021 est en open access

made with FLIPHTML5

1 2-3 4-5 6-7 8-9

1/116

ABONNEZ VOUS À LA REVUE PAV !

« FLIP PAV » N°2 JUIN 2022 EST EN ACCÈS RÉSERVÉ AUX ABONNÉS