Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

Phlébologie ANNALES VASCULAIRES 2014, 67, 2, p. 76-80

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHLEBOLOGIE

Compression médicale et ablation thermique et chimique des varices.

Medical compression, and thermal and chemical ablation of varicose veins.

Vin F.

Résumé

La compression élastique ou non élastique est indispensable après les procédures d'ablation thermique associées à la phlébectomie.

La compression permet de réduire les phénomènes inflammatoires, les ecchymoses et les hématomes.

La durée de la compression est variable en fonction de l'importance des varices traitées.

Il est recommandé de porter une compression forte de 2 à 7 jours, puis une compression classe 2, 3 semaines à 1 mois en fonction de l'importance des ecchymoses.

La compression n'est pas nécessaire au cours d'une sclérothérapie des axes saphéniens.

La compression n'est pas indispensable après injection des branches tributaires peu dilatées.

Elle est par contre recommandée après injection des perforantes ou d'importantes ectasies variqueuses.

Mots-clés : *compression médicale, élastique, non élastique, ablation thermique, ablation chimique, phlébectomie.*

Summary

Elastic or non elastic compression is essential after thermal and chemical ablation procedures associated with phlebectomy.

Compression reduces inflammation, bruising and hematomas.

The duration of the compression is variable depending on the size of varices treated.

It is recommended to wear a high compression during 2 to 7 days, then a compression class 2, for 3 weeks to 1 month, depending on the degree of bruising.

The compression is not necessary after sclerotherapy of saphenous axes.

Compression is not required after injection tributary branches slightly dilated.

It is recommended after injection for perforating veins or for large varicose ectasia.

Keywords: medical compression, elastic or non-elastic, thermal ablation, phlebectomy, chemical ablation.

Introduction

La compression médicale élastique fait partie de l'arsenal thérapeutique dans la prise en charge de la maladie veineuse chronique.

Son mode d'action a été évoqué par les différents auteurs de cet ouvrage.

Elle agit en réalisant une force de compression de travail ou de repos sur les tissus sous-cutanés et sus-aponévrotiques en réduisant les œdèmes, les ecchymoses et les hématomes.

Elle exerce également une pression plus ou moins forte sur les vaisseaux profonds et superficiels.

Dans le cadre du traitement des varices des membres inférieurs par ablation thermique ou chimique, elle a une place dont les indications sont à respecter.

Le point de la littérature

Une conférence de consensus internationale sur la compression en 2004 [1] a estimé que la mise en place **de bas ou de bandes élastiques** après injection sclérosante entraînait une réduction du calibre des veines, avec réduction de la formation de thrombus, ayant pour conséquence une diminution du risque de recanalisation.

Clinique de la veine, Hôpital américain de Paris, 63, boulevard Victor-Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine, France.
Accepté le 11 juin 2014