Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHLÉBOLOGIE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHLÉBOLOGIE
CANADIAN SOCIETY OF PHLEBOLOGY

Quizz – Que répondez-vous sur l'ESM (échosclérothérapie à la mousse) ?

Quizz – What do you say on the FES (Foam Echo-Sclerotherapy)?

Hamel-Desnos C.

N° 1. Pour la fabrication de la mousse, le mélange conseillé agent sclérosant + gaz est de :

A. 1 + 1 (1 volume de sclérosant + 1 volume de gaz)
B. 1 + 2 (1 volume de sclérosant + 2 volumes de gaz)
C. 1 + 3 (1 volume de sclérosant + 3 volumes de gaz)
D. 1 + 4 (1 volume de sclérosant + 4 volumes de gaz)
E. 1 + 5 (1 volume de sclérosant + 5 volumes de gaz)

N° 2. Par rapport à la mousse CO_2, la mousse avec air a une demi-vie :

A. 1 fois et demie plus longue
B. 2 fois plus longue
C. 3 fois plus longue
D. 4 fois plus longue
E. 5 fois plus longue

N° 3. Selon le consensus de Tegernsee, le volume total de mousse à ne pas dépasser par séance (traitement uni ou bilatéral) est de :

A. 2,5 mL
B. 5 mL
C. 10 mL
D. 20 mL
E. 30 mL

N° 4. En ESM, pour traiter une veine saphène en coupe longitudinale, on utilise des aiguilles (plusieurs réponses possibles) :

A. 22 Gauge
B. 23 Gauge
C. 26 Gauge
D. 30 Gauge

N° 5. Quelle quantité de sang est suffisante pour désactiver 2 mL de Tétradécyl Sulphate de Sodium (Trombovar®) à 3 % ?

A. 0,5 mL
B. 1 mL
C. 2 mL
D. 2,5 mL
E. 3 mL

Réponses

Question 1 : D – Question 2 : C – Question 3 : C – Question 4 : A et B – Question 5 : B